

แนวทางการผสมยาน้ำธาตุเหล็กกับยาน้ำวิตามินรวม กรณีใช้กับนักเรียนหมดภายใน ๑ วันเท่านั้น

1. อายุ ๖ เดือน – ๒ ปี ต้องให้ยาน้ำเสริมธาตุเหล็กที่มีปริมาณ element iron ๑๒.๕ มิลลิกรัม สัปดาห์ละครั้ง ในที่นี้ยาน้ำธาตุเหล็กที่มีใช้ใน รพ.อต. (Pediron Oral drop) ๐.๖ ซี.ซี. มีธาตุเหล็ก ๑๕ mg บรรจุ ๑๕ ซี.ซี. ดังนั้นหากต้องการ element iron ๑๒.๕ มิลลิกรัม ต้องดูดยาน้ำธาตุเหล็กมา ๐.๕ ซี.ซี. ยาน้ำวิตามินรวมมี ๖๐ ซี.ซี. หารด้วย ๑ ซ้อนชา คือ ๕ ซี.ซี. จะได้ 12 ซ้อนชา หากจะให้นักเรียน ๑๒ คน ๆ ละหนึ่งซ้อนชา ต้องผสมยาน้ำธาตุเหล็กลงในยาน้ำวิตามินรวม $๐.๕ \times ๑๒ = ๖$ ซี.ซี.
2. ส่วนอายุ ๒ – ๕ ปี ต้องให้ยาน้ำเสริมธาตุเหล็กที่มีประมาณ element iron ๒๕ มิลลิกรัม สัปดาห์ละครั้ง ในที่นี้ยาน้ำธาตุเหล็กที่มีใช้ใน รพ.อต. (Pediron Oral drop) ๐.๖ ซี.ซี. มีธาตุเหล็ก ๑๕ mg บรรจุ ๑๕ ซี.ซี. ดังนั้นหากต้องการ element iron ๒๕ มิลลิกรัม ต้องดูดยาน้ำธาตุเหล็กมา ๑ ซี.ซี. ยาน้ำวิตามินรวมมี ๖๐ ซี.ซี. หารด้วย ๑ ซ้อนชา คือ ๕ ซี.ซี. จะได้ 12 ซ้อนชา หากจะให้นักเรียน ๑๒ คน ๆ ละหนึ่งซ้อนชา ต้องผสมยาน้ำธาตุเหล็กลงในยาน้ำวิตามินรวม $๑ \times ๑๒ = ๑๒$ ซี.ซี.